

Associação Brasileira de Genitoscopia
Boletim Eletrônico
Agosto 2008 - 8ª edição

**ABERTAS ÀS INSCRIÇÕES DE CHAPAS PARA O PROCESSO ELEITORAL
DIRETORIA TRIÊNIO 2009-2011. A INSCRIÇÃO DE CHAPAS
ENCERRA-SE EM 28/09/2008.** Informações: secretariaabg@uol.com.br

Mulher de 32 anos de idade apresentou colposcopia, citologia cervicovaginal e anatomopatológico com as seguintes imagens...

QUAL É O BENEFÍCIO DO RASTREAMENTO POPULACIONAL COM CITOLOGIA E TESTE DE DNA DO HPV EM RELAÇÃO À CITOLOGIA ISOLADA?

A implementação do teste de DNA de HPV no rastreamento cervical leva à detecção mais precoce de lesões por neoplasia intra-epitelial cervical (NIC) grau 3 ou mais graves (NIC 3+). Este foi o achado de estudo Holandês que avaliou o rastreamento em 8.575 mulheres no grupo que realizou citologia e teste de HPV e 8.580 no grupo que realizou apenas citologia e foram acompanhadas durante cerca de 6,5 anos. Setenta por cento a mais de lesões NIC 3+ foram detectadas no grupo que realizou o teste de DNA de HPV e o número de lesões NIC 3+ detectadas no rastreamento subsequente foi 55% menor neste grupo em relação ao grupo que realizou apenas citologia. Esses achados mostram que a detecção precoce de tais lesões com o uso do teste para HPV permite aumentar o intervalo de rastreamento.

Fonte: Bulkman NWJ, Berkhof J, Rozendaal L, et al. Human papillomavirus DNA testing for the detection of cervical intraepithelial neoplasia grade 3 and cancer: 5-year follow-up of a randomised controlled implementation trial. Lancet 2007;370:1764-72.

QUAIS CONDIÇÕES CLÍNICAS ESTÃO ASSOCIADAS A VULVODÍNIA?

Em estudo caso-controle (incluindo 100 casos e 325 controles equiparados) realizado por pesquisadores americanos, a vulvodínea correlacionou-se com diversas condições clínicas, entre elas, infecções repetidas do trato urinário (*odds ratio* (OR) 6,15) e infecções fúngicas (OR 4,24). Além destas condições houve correlação com doenças crônicas, tais como síndrome de fadiga crônica (OR 2,78), fibromialgia (OR 2,15), depressão (OR 2,99) e síndrome do colón irritável (OR 1,86). A vulvodínea também comprometeu a qualidade de vida e função sexual de maneira moderada a intensa. Houve relato de 45% de dispareunia, 27% de impacto negativo no trabalho, 35% de impacto negativo nas atividades recreativas e 59% de comprometimento geral na capacidade de aproveitar a vida.

Fonte: Arnold LD, Bachmann GA, Rosen R, et al. Assessment of vulvodynia symptoms in a sample of US women: a prevalence survey with a nested case control study. Am J Obstet Gynecol 2007;196:128.e1-128.e6.

MULHERES COM ALTERAÇÃO CITOLÓGICA LEVE: A PREVALÊNCIA DE NIC DE ALTO GRAU É MAIOR EM MULHERES HIV-POSITIVAS QUANDO COMPARADAS À POPULAÇÃO GERAL?

Com o objetivo de comparar a prevalência de neoplasia intra-epitelial cervical (NIC) grau 2 ou lesão mais grave (NIC 2+), Dr Boardman e colegas compararam 72 mulheres HIV-positivas com 360 HIV-negativas com citologia ASC-US (células escamosas atípicas de significado indeterminado) ou LSIL

(lesão intra-epitelial escamosa de baixo grau). Os autores encontraram que os dois grupos tinham risco similar de NIC 2+ (15,2% para mulheres HIV-positivas *versus* 13,3% para as HIV-negativas). Nas mulheres HIV-positivas, NIC 2+ foi encontrada com maior frequência quando o CD4 era inferior a 200 células/ μ l (40%) que nas com CD4 \geq 200 células/ μ l (13%).

Fonte: Boardman LA, Cotter K, Raker CMS, et al. Cervical intraepithelial neoplasia grade 2 or worse in human immunodeficiency virus-infected women with mildly abnormal cervical cytology. Obstet Gynecol 2008;112(2, Part 1):238-43.

DROGADIÇÃO E HPV: QUAL A RELAÇÃO?

Como a drogadição está listada entre os fatores de risco para HPV, Dra. Syrjänen e colegas avaliaram o uso de drogas como fator prognóstico independente para infecções por HPV de alto risco e neoplasia intra-epitelial cervical de alto grau ou câncer (NIC 2+) em 109 mulheres drogaditas participantes do estudo coorte LAMS (*Latin American Study*). As infecções por HPV oncogênico foram significativamente mais prevalentes entre as drogaditas (37,7%) que nos controles (21,9%), mas não houve diferenças estatísticas entre os dois grupos nas lesões por NIC 2+ ($p > 0,05$). Esses dados indicam que o uso de drogas não é fator de risco independente para infecções por HPV de alto risco ou NIC 2+, mas o comportamento sexual de alto risco e os hábitos de tabagismo comuns nas mulheres drogaditas explicam a maior prevalência da infecção por HPV oncogênico.

Fonte: Syrjänen K, Naud P, Derchain S, et al. Drug addiction is not an independent risk factor for oncogenic human papillomavirus infections or high-grade cervical intraepithelial neoplasia: case-control study nested within the Latin American Screening study cohort. Int J STD AIDS 2008;19(4):251-8.

CURIOSIDADES DO PORTUGUÊS

Vaso em saca-rolha, saca-rolhas ou sacarrolha(s)? - É **saca-rolhas**, mesmo quando se usa no singular.

Interativa - Cesárea **interativa**? - É verdade que a maioria das equipes de cirurgiões operam coesas, com interação. Mas cesárea **iterativa** é aquela que depende de outra cesárea que a antecedeu para que seja realizada.

Necrotizante - Necrotizante é invenção. É uma tradução malfeita de *necrotizing*, que quer dizer **necrosante**.

Fonte: Pequeníssimo dicionário de medicina das agressões à língua portuguesa. Disponível em <http://mq.nlink.com.br/~stefan/dicionario.htm>

CELEBRAÇÃO 50 ANOS DA ABG

Premiações para os 3 melhores trabalhos originais enviados para publicação na revista brasileira de genitoscopia até 01/09/2008.

1º) PRÊMIO PROF HANS HINSELMANN - R\$ 5000,00

2º) PRÊMIO PROF JOÃO PAULO RIEPER- R\$ 3000,00

3º) PRÊMIO PROFª HILDEGARD STOLTZ- R\$ 2000,00

As normas de publicação da revista brasileira de genitoscopia podem ser vistas em nossa home page www.colposcopia.org.br ou na própria revista

Desfrute os benefícios de ser um associado da ABG

- ✓ **Descontos em livros de PTGI e Colposcopia**
- ✓ **Revista Brasileira de Genitoscopia** – publicação nacional trimestral única na área de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia
- ✓ **Cursos de educação continuada a distância** através da Internet (ver programação no www.colposcopia.org.br)
- ✓ **Boletim eletrônico mensal** com as principais publicações relevantes na área de Patologia do trato genital inferior e Colposcopia
- ✓ **Descontos em cursos, simpósios e congressos da ABG**
- ✓ **Descontos em livros da ABG**
- ✓ **Inserção em Busca de médicos qualificados no diagnóstico e tratamento das doenças HPV-induzidas e do Trato Genital Feminino** (apenas para médicos qualificados pela ABG - necessário se cadastrar através do www.colposcopia.org.br)
- ✓ **Selo de qualidade** (apenas para médicos qualificados pela ABG – maiores informações através do www.colposcopia.org.br)

EVENTOS 2008

XIII TROCANDO IDÉIAS - 28 a 30 de agosto de 2008 - Rio de Janeiro
 Informações: abg.cap.rj@gmail.com ou (21) 3473-6114 / 9771-1600

UMA IMERSÃO NO ESTUDO DA PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR E COLPOSCOPIA – RECICLAGEM E PREPARAÇÃO PARA O CONCURSO 2008 - 6 de setembro Local: São Paulo/SP -Centro de Convenções Rebouças. Informações: capítulo de São Paulo (11) 3283-4121
 E-mail: abgcapituloosp@hotmail.com

XII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GENITOSCOPIA - Patologia do Trato Genital Inferior - 18 a 21 de Setembro de 2008 - Belém do Pará/PA
 Informações: <http://www.genitoscopiapara2008.com.br/>

III CURSO DE COLPOSCOPIA E PATOLOGIA DO COLO UTERINO, VAGINA E VULVA – 20 a 22 de Novembro de 2008 – Porto Alegre-RS
 Informações: (51) 3014 2025 e-mail: relacoesassociativas@amrigs.com.br

Visite-nos no www.colposcopia.org.br

Mande sugestões através do [FALE CONOSCO](mailto:FALE_CONOSCO@uol.com.br) ou secretariaabg@uol.com.br, sua opinião é muito importante para nós.

Editoras Médicas Responsáveis:
 Dra. Cíntia Irene Parellada e Dra. Ana Carolina Chuery
 Gestão 2006-2008 Dr. Nelson Valente Martins